


Epidémiologie de la syphilis en France



Évolution du nombre de cas de syphilis récentes selon l'orientation sexuelle


(Réseau RésIST, France, 2000-2016)



Stabilisation globale en 2016
HSH : 81 % et VIH+ : 36 % des cas



Distribution des cas de syphilis récente par classe d'âge selon l'orientation sexuelle

(Réseau RésIST, France, 2000-2016)



Evolution du nombre de cas de syphilis récente chez les hommes en fonction de la région et de leur orientation sexuelle

(Réseau RésIST, France, 2000-2016)



syphilis

Stade	Manifestations cliniques	Début des signes	Durée des signes	Remarques
Syphilis primaire	Chancre , adénopathies	En moyenne 3 semaines après le début du chancre (10-100 jours)	Le chancre peut persister 2 à 6 semaines	Régresse spontanément en l'absence de traitement
Syphilis secondaire	Eruption cutanéomuqueuse (tronc, visage, paumes, plantes) avec parfois d'autres manifestations (fièvre, arthralgies, polyadénopathies, méningite, hépatite, uvéite...)	6 semaines à 6 mois après le début du chancre	L'éruption peut durer quelques jours ou quelques semaines. En l'absence de traitement, on peut noter la survenue de plusieurs éruptions cutanéomuqueuses entrecoupées de phases asymptomatiques, pendant une période variable (1, 2 ans...)	Régresse spontanément en l'absence de traitement
Syphilis latente précoce	Absence de signes cliniques		Syphilis de moins d'un an d'évolution	
Syphilis latente tardive			Syphilis de plus d'un an d'évolution	
Syphilis tertiaire	Atteinte cutanée (gomes), atteinte neurologique (tabès, paralysie générale...), atteinte cardiovasculaire (aortite, anévrysmes...)	Plusieurs années après le contagé (10 ans ou plus)		Rare de nos jours, en particulier dans les pays industrialisés, (prise fréquente de traitements antibiotiques intercurrents)