


Traitement de la syphilis précoce

Syphilis primaire, secondaire ou latente < 1 an d'évolution



TRAITEMENT : Benzathine pénicilline G (BPG)
Une injection IM de 2,4 Millions d'unités
(en 1 ou 2 injections)



**Si BPG non disponible ou
allergie aux pénicillines**

Doxycycline 200 mg/j voie orale (2
prises) pendant 14 j

Proposer consultation en
allergologie pour confirmation
allergie à la pénicilline

**Si troubles de la coagulation ou traitement
anticoagulant**

1° intention : Doxycycline 200 mg/j voie orale pendant 14 j
(2 prises)

2° intention : Ceftriaxone, injection 1 g IV pendant 10 j

Traitement de la syphilis tardive

Syphilis secondaire et latente > 1 an d'évolution ou ancienneté inconnue

Syphilis secondaire


Syphilis latente



TRAITEMENT : Benzathine pénicilline G (BPG)

Trois injections IM de 2,4 Millions d'unités

(en 1 ou 2 injections)



Si allergie aux pénicillines

Doxycycline 200 mg/j voie orale
(2 prises) pendant 28 j


Proposer consultation en
allergologie

**Si troubles de la coagulation ou traitement
anticoagulant**

Doxycycline 200 mg/j voie orale pendant 28 j (2 prises)

Traitement de la syphilis tertiaire et cardiovasculaire

TRAITEMENT : Benzathine pénicilline G (BPG)
Trois injections IM de 2,4 Millions d'unités



Si allergie aux pénicillines

**Si troubles de la coagulation ou traitement
anticoagulant**

**Doxycycline 200 mg/j voie orale
(2 prises) pendant 28 j**

Doxycycline 200 mg/j voie orale (2 prises) pendant 28 j

**Proposer consultation en
allergologie**

Traitement de la neurosyphilis, syphilis ophtalmologique et otosyphilis

TRAITEMENT : Benzathine pénicilline G (BPG)
Injection IV de 20 Millions d'unités pendant 10 à 14 j
(perfusion continue ou discontinue)

**Alternative possible dans les formes de neurosyphilis (NS)
non compliquées**
(NS légères, uvéite, otosyphilis, paralysie d'une paire crânienne ...)
Injections IV de 2 g ceftriaxone en une perfusion pendant 10 à 14 j
(réduction de la durée d'hospitalisation)

Si **allergie grave** aux
pénicillines

Proposer consultation en
allergologie avec tests allergiques
et induction de tolérance si
l'allergie est confirmée

Si **allergie non grave** aux
pénicillines

Ceftriaxone 2 g par voie IV en
perfusion pendant 10 à 14 j

Si **symptomatologies oculaire
et/ou vestibulo-cochléaire**

Consultations ophtalmologique
et/ou ORL **en urgence**

Discuter: Doxycycline 200 mg 2
fois par jour pendant 28 j

Traitement de la syphilis chez la femme enceinte

LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE

TRAITEMENT : Benzathine pénicilline G (BPG)

Une injection IM de 2,4 Millions d'unités

(en 1 ou 2 injections)



Si allergie aux pénicillines

Traitement Doxycycline 200 mg 2 fois par jour pendant 28 j pendant le 1^{er} trimestre de grossesse (contre-indication à partir du 2^e trimestre)

➡ Traitement du nouveau-né à la naissance par Benzylpénicilline G en IV

Proposer consultation en allergologie avec tests allergiques et induction de tolérance si l'allergie est confirmée

Traitement de la syphilis congénitale

Syphilis précoce ou tardive



TRAITEMENT : Benzylpénicilline (pénicilline G)

Injection IV de 150 000 unité/kg pendant 10 à 14 j

Perfusion continue de 2 fois 12 h

ou

Perfusion discontinue 6 fois / j (AE)

Alternative possible par voie IM si le LCS est normal

Pénicilline G 50 000 unité/kg en 1 dose IM (maximum 2,4 M unités) pendant 10 à 14 j

Annexe : induction de tolérance à la pénicilline

Syphilis précoce

Ann Dermatol Venerol
2006;133:2519-23

Annexe

DÉSENSIBILISATION ORALE À LA PÉNICILLINE

(d'après Stark et Sullivan J. Allergy and Clin. Immunol. 1987)

Consentement éclairé signé par le patient

SURVEILLANCE MÉDICALE RÉGULIÈRE ++++

N° dose	Unités administrées	Voie d'administration	Espacement entre les doses	Dose et concentration
1	100 ui	ORALE	15 minutes	1 ml (100 u/ml)
2	200 ui			2 ml
3	400 ui			4 ml
4	800 ui			8 ml
5	1 600 ui			1,6 ml (1 000 u/ml)
6	3 200 ui			3,2 ml
7	6 400 ui			6,4 ml
8	12 800 ui			12,8 ml
9	25 000 ui			2,5 ml (10 000 u/ml)
10	50 000 ui			5 ml
11	100 000 ui			1 ml (100 000 u/ml)
12	200 000 ui			2 ml
13	400 000 ui			4 ml
14	200 000 ui	SC	15 minutes	
15	400 000 ui			
16	800 000 ui			
17	1 000 000 ui	IM	15 minutes	
18	Dose thérapeutique	IV	Chronologie habituelle sans jamais espacer plus de 8 heures les doses délivrées	

Voie veineuse impérative - Chariot de réanimation à proximité
adrénaline, corticoïde injectable, antihistaminique disponibles

Faire préparer par la pharmacie de l'hôpital les dilutions de pénicilline de 100 000 ui/ml à 100 ui/ml
à partir de la phénoxyéthylpénicilline (Oracilline suspension 1 000 000 ui/10 ml).

Passer à la péni G (flacons à 1 000 000 ui) pour les injections.